

UPUTSTVO ZA LEK

Immunokind®, 20 mg + 20 mg + 20 mg + 20 mg, tablete

calcium carbonicum Hahnemanni trit. D6, calcium fluoratum trit. D6, calcium phosphoricum trit. D6, sulfur jodatum trit. D12

Homeopatski lek

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

- Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom lekaru, farmaceutu ili medicinskoj sestri.
- Ovaj lek propisan je samo Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake bolesti kao i Vi.
- Ukoliko Vam se javi bilo koje neželjeno dejstvo, obratite se Vašem lekaru, farmaceutu ili medicinskoj sestri. Ovo uključuje i bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu. Vidite odeljak 4.

U ovom uputstvu pročitaćete:

1. Šta je lek Immunokind i čemu je namenjen
2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Immunokind
3. Kako se uzima lek Immunokind
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lek Immunokind
6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

1. Šta je lek Immunokind i čemu je namenjen

Immunokind je homeopatski lek namenjen jačanju imunskog sistema beba i dece sa čestim i ponovljenim akutnim infekcijama respiratornog trakta.

Primena ovog leka zasniva se isključivo na načelima homeopatije.

2. Šta treba da znate pre nego što primite lek Immunokind

Lek Immunokind ne smete uzimati:

Lek Immunokind ne smete koristiti ukoliko znate da je Vaše dete alergično (preosetljivo) na neku od aktivnih supstanci ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka (navedene u odeljku 6)

Upozorenja i mere opreza:

Obratite se Vašem lekaru:

- Ako ne dođe do poboljšanja stanja ili se tegobe često ponavljaju
- Ako se pojave dodatne tegobe

Nemojte koristiti Immunokind tablete duže od dve nedelje bez konsultacije sa lekarom.

Ukoliko dete boluje od bolesti štitaste i paraštitaste žlezde, roditeljima se preporučuje da se pre primene tableta Immunokind obrate lekaru.

Drugi lekovi i Immunokind

Obavestite svog lekara ili farmaceuta ukoliko dete uzima, donedavno je uzimalo ili će možda uzimati bilo koji drugi lek, uključujući i lekove koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.

Nisu zabeležene interakcije sa drugim lekovima. Upotreba ovog homeopatskog leka ne isključuje upotrebu drugih lekova.

Uzimanje leka Immunokind sa hranom i pićima

Ne preporučuje se uzimanje leka Immunokind istovremeno sa hranom i pićima. Lek Immunokind treba uzeti najmanje pola sata pre ili posle jela.

Trudnoća i dojenje

Nije primenljivo. Ovaj homeopatski lek je namenjen deci.

Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

Nije primenljivo. Ovaj homeopatski lek je namenjen deci.

Lek Immunokind sadrži laktozu

Immunokind sadrži laktozu (mlečni šećer). U slučaju netolerancije Vašeg deteta na neke od šećera, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.

3. Kako se uzima lek Immunokind

Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom. Uobičajena doza je:

Deca uzrasta do 6 godina: Uzeti po 1 tabletu 3 puta dnevno.

Pustiti da se tableta rastopi u ustima. Za bebe i malu decu tableta se pre primene može rastvoriti u kafenoj kašičici punoj vode.

Ne preporučuje se uzimanje tableta Immunokind istovremeno sa hranom i pićem. Tablete Immunokind treba uzeti najmanje pola sata pre ili posle jela

Ako ste uzeli više leka Immunokind nego što treba

Nema štetnih efekata u slučaju predoziranja.

Ako ste zaboravili da uzmete lek Immunokind

Ne uzimajte duplu dozu da bi ste nadoknadiili propuštenu dozu.

Ako naglo prestanete da uzimate lek Immunokind

Ne očekuju se štetni efekti nakon prestanka uzimanja leka Immunokind.

Ako imate dodatnih pitanja o uzimanju ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

4. Moguća neželjena dejstva

Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se javi kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.

Do sada nisu poznata nikakva neželjena dejstva nastala upotreboom leka Immunokind.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.

Napomena: tokom primjene homeopatskih lekova može doći do prolaznog pogoršanja postojećih tegoba (inicijalno pogoršanje). U takvim slučajevima, prekinite terapiju lekom Immunokind i konsultujte se sa svojim lekarom.

Prijavljanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara, farmaceuta ili medicinsku sestruru. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije
Nacionalni centar za farmakovigilancu
Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd
Republika Srbija
website: www.alims.gov.rs
e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

5. Kako čuvati lek Immunokind

Čuvati lek van domaćaja i vidokruga dece.

Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.

Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 12 meseci. Čuvati na temperaturi do 25°C.

Ne smete koristiti lek Immunokind posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju nakon „Važi do:“. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.

Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

Šta sadrži lek Immunokind

Aktivne supstance:

Jedna tableta sadrži:

Calcium carbonicum Hahnemanni trit. D6	20mg
Calcium fluoratum trit. D6	20mg
Calcium phosphoricum trit. D6	20mg
Sulfur jodatum trit. D12	20mg

Pomoćne supstance: celuloza, mikrokristalna; talk; magnezijum-stearat.

Kako izgleda lek Immunokind i sadržaj pakovanja

Okrugle, ravne, fasetirane tablete bele do skoro bele boje.

Unutrašnje pakovanje je bočica od tamnog stakla hidrolotičke grupe III sa zatvaračem sa navojem bele boje od polietilena visoke gustine (HDPE).

U unutrašnjosti zatvarača nalazi se aluminijumski uložak sa zaštitnim lakom (disk Alu0,1/ALKPzell/Alu 0,01).

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi bočica sa 150 tableta i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač

Nosilac dozvole:

ALPEN PHARMA DOO BEOGRAD (ZVEZDARA) , Ulcinjska 13, sprat 4, stan 10, Beograd-Zvezdara, 11050 Srbija

Proizvođač:

DR. GUSTAV KLEIN GMBH & CO. KG,
Steinenfeld 3, 77736 Zell am Harmersbach, Nemačka

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno:

Mart, 2023

Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje bez lekarskog recepta.

Broj i datum dozvole:

515-01-02283-19-001 od 26.03.2020.